Rotenona

UV, RMN^{1}H, RMN^{13}C, EMIE, características físicas, rotación específica, punto de fusión y Citotoxicidad contra BC1, Lu1, Col2, KB, KB-V, LNCaP, SW626, SKNSH, M109.
Blatt CTT, Chávez D, Chai H, Graham JG, Cabieses F, Farnsworth NR, Cordell GA, Pezzuto JM, Kinghorn AD. 2002. Cytotoxic flavonoids from the stem bark of Lonchocarpus aff. Fluvialis. Phytotherapy research 16(4): 320-325.

Actividad larvicida contra *Aedes aegypti* (LD50 0.47 ± 0.2 µg/ml)
Yenesew A, Kiplagat JT, Derese S, Midiwo JO, Kabaru JM, Heydenreich M, Peter MG. 2006. Two unusual rotenoid derivatives, 7a-O-methyl-12a-hydroxydeguelol and spiro-13-homo-13-oxaelliptone, from the seeds of Derris trifoliate Phytochemistry 67(10): 988-991.

Induce la enfermedad de Parkinson en ratas
Caboni P, Sherer TB, Zhang N, Taylor G, Na HM, Greenamyre JT, Casida JE. 2004. Rotenone, Deguelin, their metabolits, and the rat model of Parkinson´s desease. Chem Res Toxicol 17(11): 1540-1548.